

ESQUEMA BÁSICO VACINAL 2017- PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

IDADE	VACINA	PROTEÇÃO CONTRA	ESQUEMA/ DOSE
Ao nascer até 1 mês de vida	Hepatite B	Hepatite B	1ª dose na maternidade (0,5 ml - IM) as outras doses juntas com a Pentavalente.
	BCG	Tuberculose	1 dose (0,1 ml - ID)
2 meses	Pentavalente	difteria, tétano, coqueluche e <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b e hepatite B.	1ª dose (0,5 ml - IM)
	Rotavírus	Rotavírus	1ª dose (1 ml - VO)
	Vacina inativada da Poliomielite (VIP)	Poliomielite	1ª dose (0,5 ml - IM)
	Pneumocócica 10-Valente	Pneumonias, meningites, sinusites e otites causadas pelo <i>Streptococcus pneumoniae</i>	1ª dose (0,5 ml - IM)
3 meses	Meningocócica C (conjugada)	Meningite causada pela <i>Neisseria meningitidis</i>	1ª dose (0,5 ml - IM)
4 meses	Pentavalente	difteria, tétano, coqueluche e <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b e hepatite B.	2ª dose (0,5 ml - IM)
	Rotavírus	Rotavírus	2ª dose (1 ml - VO)
	Vacina inativada	Poliomielite	2ª dose (0,5 ml - IM)

	da Poliomielite (VIP)		
	Pneumocócica 10-Valente	Pneumonias, meningites, sinusites e otites causadas pelo <i>Streptococcus pneumoniae</i>	2ª dose (0,5 ml - IM)
5 meses	Meningocócica C (conjugada)	Meningite causada pela <i>Neisseria meningitidis</i>	2ª dose (0,5 ml - IM)
6 meses	Pentavalente	difteria, tétano, coqueluche e <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b e hepatite B.	3ª dose (0,5 ml - IM)
	Vacina inativada da Poliomielite (VIP)	Poliomielite	3ª dose (0,5 ml - IM)
	Anti-influenza (gripe)	Influenza do tipo A e B	2 doses com intervalo de 1 mês cada (0,25 ml - IM)
9 meses	Anti-amarela	Febre Amarela	1 dose (0,5 ml - SC)
1 ano (12 meses)	Tríplice Viral (VTV)	Sarampo, caxumba e rubéola	1ª dose (0,5 ml - SC)
	Pneumocócica 10-Valente	Pneumonias, meningites, sinusites e otites causadas pelo	1 dose de reforço (0,5 ml - IM)

		<i>Streptococcus pneumoniae</i>	
15 a 18 meses	Tríplice Bacteriana (DTP)	Difteria, coqueluche e tétano	1ª dose (0,5 ml – IM)
	Vacina Oral da Poliomielite (VOP)	Poliomielite	1º reforço da VIP (2 gotas - VO)
	Tetra Viral (SCRV)	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela.	1 dose (0,5 ml – SC)
	Hepatite A	Hepatite A	1 dose (0,5 ml – IM)
	Meningocócica C (conjugada)	Meningite causada pela <i>Neisseria meningitidis</i>	1 dose de reforço (0,5 ml – IM)
4 anos	Tríplice Bacteriana (DTP)	Difteria, coqueluche e tétano	2ª dose (0,5 ml – IM)
	Vacina Oral da Poliomielite (VOP)	Poliomielite	2º reforço da VIP (2 gotas - VO)
9 a 45 anos	Dengue (apenas para áreas endêmicas e/ou indicadas pelas Secretarias de Saúde)	Dengue dos tipos 1, 2, 3 e 4	3 doses com intervalo de 6 meses cada (0,5 ml – SC)
	Tríplice Viral (VTV)	Sarampo, caxumba, rubéola e varicela.	1 reforço (0,5 ml – SC) (até 30 anos de idade)

Adolescente	Meningocócica C (conjugada)	Meningite causada pela <i>Neisseria meningitidis</i>	1 reforço com idade entre 12 e 13 anos (0,5 ml – IM)
	HPV	Papiloma Vírus Humano dos tipos (6, 11, 16 e 18)	2 doses com intervalo de 6 meses (0,5 ml – IM) (aplicada em meninas com idade entre 09 a 15 anos, e meninos entre 12 e 14)
	Dupla Adulta ou dupla bacteriana (dT)	Difteria e tétano	1 dose de reforço a cada 10 anos para quem tem esquema vacinal de DTP. Para início do esquema deve ser feita em 3 doses com intervalo de 2 meses cada (0,5 ml – IM)
Adulto (vacinas que podem ser aplicadas)	Dupla Adulta ou dupla bacteriana (dT)	Difteria e tétano	1 dose de reforço a cada 10 anos para quem tem esquema vacinal de DTP. Para início do esquema deve ser feita em 3 doses com intervalo de 2 meses cada 1 reforço a cada 10 anos (0,5 ml – IM)
	Hepatite B	Hepatite B	Feita em 3 doses: 1ª

	(vacinas que podem ser feitas)		dose - no dia, 2ª dose - 1 mês após a 1ª; 3ª dose - 6 meses após a 1ª dose (1,0 ml – IM)
Gestante	DTPa (acelular)	Difteria, coqueluche e coqueluche acelular	Aplicada em cada gestação, a partir da 20ª semana (com esquema completo de dT) (0,5 ml – IM) Obs. deve ser aplicada em profissionais de saúde que atuam em maternidade, aplica-se a DTPa substituindo a dose de reforço da dT.
	Hepatite B (vacinas que podem ser feitas)	Hepatite B	Feita caso Anti HBs resulte em não reagente. Aplicada em 3 doses: 1ª dose - no dia, 2ª dose - 1 mês após a 1ª; 3ª dose - 6 meses após a 1ª dose (1,0 ml – IM).
Idoso (incluir as vacinas de Adulto)	Anti-influenza (gripe)	Influenza do tipo A e B	1 dose anual (0,5 ml – IM)
	Dupla Adulta ou dupla bacteriana (dT)	Difteria e tétano	Se passado de 5 anos da última dose da dT ou DTP ou

Acidentes com objetos perfuro cortantes e animais (Antirrábica)			DTPa fazer uma dose de reforço (0,5 ml – IM)
	Hepatite B (vacinas que podem ser feitas)	Hepatite B	Refazer as 3 doses caso Anti HBs resulte em não reagente (1,0 a 2,0 ml – IM)
	Antirrábica	Raiva	Dependerá da avaliação do animal, do local de contato e a profundidade da lesão. O esquema completo é realizado em 5 doses: 1ª dose no dia da ocorrência, 2ª dose 3 dias após a primeira, 3ª dose 7 dias após a primeira, 4ª dose 14 dias após a primeira, e última dose 28 dias após a primeira.