



PROCESSO SELETIVO 2023

Ano Letivo de 2024

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA ENFERMAGEM



INSTRUÇÕES

1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
2. O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
3. A duração da prova **com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
5. A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
7. Em cada questão, há somente uma resposta correta.
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
 - d) não o amasse, nem dobre.



**PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA
ENFERMAGEM**

QUESTÕES GERAIS

1. São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.

II - integralidade de assistência, entendida como a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

III - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.

IV - definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;

V - participação da comunidade.

Estão corretas:

- a) apenas I, II, III e V.
- b) apenas I, II e V.
- c) Apenas III e V
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

2. Sobre o disposto na Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é **correto** afirmar:

a) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

b) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde.



3. Com relação ao Projeto Terapêutico Singular (PTS), de acordo com a Política Nacional de Humanização (2010), assinale a alternativa **correta**:

- a) É um instrumento de organização e sistematização do cuidado construído exclusivamente pela equipe de enfermagem e psicologia, considerando singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso.
- b) PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas, articuladas, para um sujeito individual, resultado da discussão coletiva de uma equipe de enfermeiros e psicólogos. A proposta é focada no indivíduo, não sendo possível uma abrangência coletiva.
- c) As tarefas devem estar de acordo com a intensidade e a qualidade do vínculo construído com o usuário, ou seja, os profissionais que tenham vínculos mais amplos devem assumir mais responsabilidade na coordenação do PTS.
- d) A construção de contratos/projetos terapêuticos entre sujeitos não pode ser entendida, por outro lado, como ação que não deriva de embate produzido na tensa relação que se estabelece entre sujeitos que ocupam distintas posições nas relações de saúde, ou seja, usuários e trabalhadores da saúde.

4. De acordo com a Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2021, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, no Capítulo I no artigo 7º– São responsabilidades comuns a todas as esferas do governo:

- I. Articulação com o subsistema Indígena nas ações de Educação Permanente e gestão da rede assistencial.
- II. Desenvolver as ações de assistência farmacêutica e do uso racional de medicamentos, garantindo a disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em conformidade com a RENAME, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e com a relação específica complementar estadual, municipal, da união, ou do distrito federal de medicamentos nos pontos de atenção, visando a integralidade do cuidado.
- III. Garantir, de forma tripartite, dispositivos para transporte em saúde, compreendendo as equipes, pessoas para realização de procedimentos eletivos, exames, dentre outros, buscando assegurar a resolutividade e a integralidade do cuidado na Rede de Atenção à Saúde, conforme necessidade do território e planejamento de saúde.

Estão corretas as seguintes afirmativas:

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) I, II e III.



5. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Quanto à infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção básica, assinale nas sentenças abaixo V para afirmativa Verdadeira e F para Falsa:

() A infraestrutura de uma UBS deve estar adequada ao quantitativo de população adscrita e suas especificidades, bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários.

() A ambiência de uma UBS refere-se a pactuação de fluxos e protocolos, apoio matricial presencial e/ou a distância, entre outros.

() Para um ambiente adequado em uma UBS, existem componentes que atuam como modificadores e qualificadores do espaço, recomenda-se contemplar: recepção sem grades (para não intimidar ou dificultar a comunicação e também garantir privacidade à pessoa), identificação dos serviços existentes, escala dos profissionais, horários de funcionamento e sinalização de fluxos, conforto térmico e acústico, e espaços adaptados para as pessoas com deficiência em conformidade com as normativas vigentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**:

- a) V,V,V
- b) V,F,V
- c) F,V,V
- d) V,V,F

6. São estratégias prioritárias de implementação de ações sobre os determinantes sociais, **EXCETO**:

- a) Governança para o enfrentamento das causas mais profundas das iniquidades em saúde.
- b) Promoção da participação.
- c) O papel do setor social, incluindo os programas e políticas públicas, na redução das iniquidades sociais.
- d) Monitoramento do progresso: medir e analisar para informar as políticas sobre determinantes sociais.



7. De acordo com a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), no que diz respeito às condições para se obter sucesso na implementação de ações intersetoriais, assinale a alternativa **correta**:

- a) Assegurar a participação exclusivamente dos profissionais de saúde; educar e conscientizar os profissionais a respeito dos determinantes da saúde e da ação intersetorial.
- b) Investir em processos de construção de alianças trabalhando em conjunto, mesmo que culmine em divergência, durante a fase de planejamento.
- c) Enfatizar valores, interesses e objetivos compartilhados entre parceiros atuais e parceiros em potencial.
- d) Engajar parceiros importantes no final do processo: ser exclusivo.

8. Sobre a rede de atenção às urgências, reformulada por meio da Portaria nº 1.600, de 7 de julho de 2011, é **correto** afirmar:

I - Entre os serviços que compõem a Rede de Atenção às Urgências estão: Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde; Atenção Básica em Saúde e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências.

II – Entre as diretrizes da Rede de Atenção às Urgências está a articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção.

III – A Atenção Domiciliar não faz parte da Rede de Atenção às Urgências, sendo um dos componentes da Política Nacional da Atenção Básica.

Estão corretas:

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

9. Sobre os princípios da Bioética, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Para que o respeito pela Autonomia das pessoas seja possível, duas condições são fundamentais: liberdade e informação. Isso significa que, em um primeiro momento, a pessoa deve ser livre para decidir. Para isso, ela deve estar livre de pressões externas, pois qualquer tipo de pressão ou subordinação dificulta a expressão da autonomia. Com relação à informação, a correta informação das pessoas possibilita o estabelecimento de uma relação terapêutica.
- b) Com relação à Beneficência e a Não Maleficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua



totalidade (todas as dimensões do ser humano devem ser consideradas: física, psicológica, social, espiritual), visando oferecer o melhor tratamento.

c) Quanto ao princípio da Justiça, costuma-se acrescentar outro conceito a este: o conceito de equidade que representa dar a cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades, isto é, incorpora-se a idéia de que as pessoas são diferentes e que, dessa forma, também são diferentes as suas necessidades.

d) Os profissionais de saúde que se baseiam na postura paternalista são aqueles que respeitam a autonomia de seus pacientes e que permitem que o paciente manifeste sua vontade.

10. Sobre a RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências, é **correto** afirmar:

a) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.

b) A cultura da segurança se refere à totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem.

c) A segurança cirúrgica e a prevenção de quedas dos pacientes não devem ser abordadas no Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente.

d) Compete à ANVISA, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, manter sob sua guarda e disponibilizar às autoridades sanitárias, quando requisitado, as notificações de eventos adversos.



QUESTÕES ESPECÍFICAS

11. De acordo com o Decreto nº 94.406 de 8 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, e dá outras providências, é atividade privativa do enfermeiro:

- a) A prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar.
- b) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enterocлизма, enema e calor ou frio.
- c) Assistir ao parto normal, inclusive em domicílio.
- d) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;

12. Leia o caso abaixo:

Um técnico de enfermagem é contratado por um laboratório de análises clínicas para realizar coletas de sangue. A instituição não possui enfermeira no corpo clínico. Durante a primeira coleta ele sofre um acidente com material perfuro cortante e a equipe do laboratório descobre que o técnico não possuía experiência profissional neste tipo de atividade. Este fato é denunciado ao Conselho Regional de Enfermagem que notifica o responsável pela instituição quanto aos itens que dispõe sobre o exercício da enfermagem.

Com relação à Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Ao Enfermeiro cabe a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- b) Ao técnico de enfermagem cabe executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro.
- c) As atividades relacionadas ao Auxiliar e Técnico de Enfermagem poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e direção de Enfermeiro quanto estiverem lotados em serviços de saúde. Quando se tratar de atividades realizadas em domicílio ou fora do ambiente de saúde, auxiliares e técnicos podem exercer suas atividades sem supervisão do enfermeiro.
- d) Ao Enfermeiro cabe a participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada.



13. O Processo de Enfermagem deve ser realizado em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Sobre o Processo de Enfermagem, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A Coleta de Dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- b) O Planejamento de Enfermagem consiste na verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado.
- c) O Diagnóstico de Enfermagem compreende o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados e representa as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença.
- d) O Diagnóstico de Enfermagem é a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.

14. Sobre a Resolução nº 358/2009, analise as afirmativas abaixo:

- I. A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo um resumo dos dados coletados; os diagnósticos de enfermagem; as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem; e os resultados alcançados.
- II. O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.
- III. O Técnico e o Auxiliar de Enfermagem não participam da execução do Processo de Enfermagem.

Estão corretas:

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.

15. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo:

- I. Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão.
- II. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras.



III. Prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto em caso de emergência, ou que estiverem expressamente autorizados na legislação vigente.

Assinale a alternativa correta:

- a) A afirmativa I se refere a um direito do profissional; enquanto as afirmativas II e III se referem aos deveres.
- b) As afirmativas I e II tratam-se de deveres dos profissionais; enquanto que a afirmativa III trata-se de uma proibição.
- c) A afirmativa I se refere a um direito do profissional; a afirmativa II a um dever; e a afirmativa III a uma proibição.
- d) A afirmativa I se refere a um dever do profissional; a afirmativa II se refere a um direito; e a afirmativa III se refere a uma proibição.

16. No Paraná, em 2014, as causas mais frequentes de internação hospitalar de idosos, de acordo com Capítulos CID10, foram as:

- a) Doenças endócrinas.
- b) Doenças do aparelho circulatório.
- c) Doenças oftalmológicas.
- d) Ansiedade e depressão.

17. Com relação à condição de sarcopenia em idosos e a medida da circunferência de panturrilha (CP), assinale a alternativa correta:

- a) CP menor que 29 cm é indicativo de sarcopenia.
- b) CP menor que 31 cm é indicativo de sarcopenia.
- c) CP menor que 41 cm é indicativo de sarcopenia.
- d) CP menor que 39 cm é indicativo de sarcopenia.

18. Leia as sentenças abaixo e assinale V para Verdadeiro e F para Falso:

- () A população idosa é heterogênea e tem características e necessidades de cuidados específicos.
- () A senescência trata do envelhecimento patológico.
- () Polipatologia, poli-incapacidades e polifarmácia são comuns no idoso e constituem um dos principais fatores de risco para a iatrogenia.
- () A autonomia é a capacidade individual de executar algo com os próprios meios, sem a ajuda de outra pessoa.



Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) V,V,F,F.
- b) F,V,F,V.
- c) V,F,V,F.
- d) V,F,V,V.

19. Com relação à incontinência urinária (IU) em idosos, associe o tipo de IU com sua respectiva sintomatologia clínica:

Tipo de IU:

I - IU funcional

II - IU mista

III - IU de urgência (bexiga hiperativa)

Sintomatologia Clínica:

() etiologia multifatorial. Muitas idosas apresentam hiperatividade do músculo detrusor e ao mesmo tempo evidências clínicas de IU de esforço, por exemplo.

() é a causa mais comum em idosos. Ocorre por contrações não inibidas da bexiga pela hiperatividade do detrusor, músculo interno na bexiga. Esse mecanismo pode ser causado por condições locais como uretrite, tumores e litíase, ou por alterações no SNC, como AVC, demência e parkinsonismo.

() não há comprometimento dos mecanismos controladores da micção. A perda involuntária da urina ocorre por incapacidade de chegar ao banheiro devido a limitações físicas, déficit cognitivo, alterações psicológicas ou barreiras ambientais. Suas causas mais comuns são: demência grave, imobilidade, ataduras e depressão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) I,II,III
- b) II,III,I
- c) III,II,I
- d) I,III,II

20. O teste de Fagerstrom é aplicado em gestantes para avaliar a seguinte condição:

- a) Grau de dependência ao etilismo;
- b) Grau de dependência à nicotina;
- c) Grau de dependência às drogas ilícitas;
- d) Grau de dependência quanto a funcionalidade global.



21. Com relação ao Descolamento Prematuro da Placenta (DPP) e a classificação de Sher, assinale o grau com sua respectiva descrição:

I – Grau 1.

II – Grau 2.

III – Grau 3.

() Presença de taquicardia materna e alterações posturais da pressão arterial. Alterações iniciais da coagulação com queda dos níveis de fibrinogênio.

() Sangramento genital discreto ausência de hipertonia uterina significativa.

() Sangramento genital importante com hipertonia uterina. Hipotensão arterial materna.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) II, I, III.

b) I,II,III.

c) III,II,I.

d) III,I,II.

22. Considerando a consulta puerperal, assinale a alternativa correta:

a) Garantir, no mínimo, 01 consulta de puerpério a ser realizada até 40 dias da data do nascimento.

b) Garantir, no mínimo, duas consultas de puerpério, sendo a primeira, entre 7 a 10 dias após o parto e a segunda, até 30 após o parto, preferencialmente associada à consulta de puericultura.

c) Garantir, no mínimo, três consultas de puerpério, sendo a primeira, entre 7 a 10 dias após o parto, a segunda, até 20 após o parto e a terceira até 30 após o parto, preferencialmente associada à consulta de puericultura.

d) Não há necessidade da consulta puerperal, pois a mãe será atendida junto com o bebê durante a consulta de puericultura.

23. Para fins da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança - (PNAISC), considera-se:

a) primeira infância: pessoa na faixa etária de 1 (um) a 6 (seis) anos, ou seja, de 1 (um) a 72 (setenta e dois) meses.

b) criança: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 9 (nove) anos, ou seja, de 0 (zero) a 120 (cento e vinte) meses.

c) primeira infância: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 12 (doze) anos, ou seja, de 0 (zero) a 144 (cento e quarenta e quatro) meses.

d) criança: pessoa na faixa etária de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos, ou seja, de 12(doze) a 216 (duzentos e dezesseis) meses.



24. São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno. Leia as alternativas abaixo e assinale a que apresenta uma contra-indicação para a amamentação:

- a) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2 (vírus linfotrópico humano de linfócitos T).
- b) Mães que apresentem intolerância a lactose.
- c) Mães em estado febril ou com diagnóstico de infecção de vias aéreas.
- d) Mães tabagistas.

25. São ações estratégicas do eixo de atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido, **EXCETO**:

- a) a prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis.
- b) a atenção humanizada e qualificada ao parto e ao recém nascido no momento do nascimento, com capacitação apenas dos profissionais de enfermagem para prevenção da asfixia neonatal.
- c) a qualificação da atenção neonatal na rede de saúde materna, neonatal e infantil, com especial atenção aos recém-nascidos graves ou potencialmente graves, internados em Unidade Neonatal, com cuidado progressivo entre a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e a Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).
- d) a atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso, com a utilização do "Método Canguru".

26. Com relação à Vacina Rotavírus humano G1P [8] (atenuada) – VRH assinale a alternativa **correta**:

- a) Administrar dose única aos 2 (dois) meses de idade.
- b) Crianças com histórico de invaginação intestinal ou com malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal podem receber a vacina.
- c) Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose.
- d) Crianças com imunodepressão nunca deverão ser vacinadas com VRH.

27. Com relação à vacina Tríplice Viral –VTV, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Trabalhadores da saúde independentemente da idade devem receber 4 (quatro) doses de tríplice viral, conforme situação vacinal encontrada, observando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Deve-se considerar vacinado o trabalhador da saúde que comprovar 4 (quatro) doses de vacina tríplice viral.



- b) A vacina tetra viral está disponível na rotina de vacinação para crianças com idade entre 15 meses e 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias.
- c) Pessoas de 5 (cinco) a 29 anos de idade não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber ou completar o esquema de duas doses de tríplice viral, conforme situação encontrada, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Deve-se considerar vacinada a pessoa que comprovar 2 (duas) doses de vacina contendo os componentes sarampo, caxumba e rubéola (tríplice viral ou tetraviral).
- d) Pessoas de 30 a 59 anos de idade não vacinadas devem receber uma dose de tríplice viral. Deve-se considerar vacinada contra o sarampo a pessoa que comprovar 1 (uma) dose de vacina contendo o componente sarampo (monovalente, dupla viral ou tríplice viral).

28. Quanto a Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) tipo adulto – dTpa, assinale a alternativa **correta**:

- a) Gestante **NÃO** vacinada previamente, administrar dose única de vacina contendo toxoide tetânico e diftérico.
- b) Gestante vacinada com 1 (uma) dose de dT, administrar 1 (uma) dose de dT em qualquer momento da gestação e 1 (uma) dose de dTpa a partir vigésima semana de gestação com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias.
- c) Gestante vacinada com 3 (três) doses de dT, não necessitam de dose de dTpa.
- d) Gestante vacinada com 2 (duas) doses de dT, administrar 1 (uma) dose da dT a partir vigésima semana de gestação, para completar o esquema vacinal.

29. A hipoglicemia compreende uma complicação frequente do Diabetes. Sobre essa complicação, é **INCORRETO** afirmar:

- a) A hipoglicemia em indivíduos insulino dependentes resulta da administração de insulina em excesso, do consumo insuficiente de alimentos ou de ambas as condições.
- b) Pacientes em hipoglicemia podem desenvolver alterações do estado mental e crises convulsivas.
- c) O enfermeiro deve estar preparado para reconhecer sinais e sintomas de hipoglicemia, a fim de iniciar o tratamento de forma rápida e eficiente.
- d) A hipoglicemia é definida como o nível de glicemia inferior a 85 mg/dl.

30. Sobre a Cetoacidose Diabética, é **correto** afirmar:

- a) A insulino terapia, reanimação com fluidos e correção dos eletrólitos compreendem a base do tratamento da Cetoacidose Diabética.
- b) A Cetoacidose Diabética caracteriza-se por concentração plasmática de glicose menor que 70 mg/dl.



- c) Pacientes com Cetoacidose Diabética grave raramente apresentam alteração do estado mental.
- d) Um dos sinais da Cetoacidose Diabética é a diminuição da diurese.

31. Sobre os distúrbios neurológicos, é **INCORRETO** afirmar:

- a) O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode ser classificado em isquêmico ou hemorrágico.
- b) Durante um Acidente Vascular Encefálico (AVE) isquêmico, o fluxo de sangue para determinada parte do encéfalo é interrompido, causando isquemia.
- c) É importante que o enfermeiro investigue sobre a última vez que o paciente foi visto bem. Essa é uma das informações importantes para verificar o limite de tempo para administração de trombolítico, caso indicado.
- d) Os sintomas de Acidente Vascular Encefálico (AVE) geralmente têm início gradual.

32. Sobre a Reanimação Cardiopulmonar do adulto, assinale a alternativa **correta**:

- a) Para pacientes sem via aérea avançada a relação compressão ventilação deve ser de 15 compressões para 02 ventilações.
- b) A dose de adrenalina utilizada na Parada Cardiorrespiratória deve ser de 2mg a cada 5 minutos.
- c) Devem-se alternar os profissionais responsáveis pela compressão a cada 2 minutos, ou antes, em caso de cansaço.
- d) Assitolia e Fibrilação ventricular são ritmos chocáveis de Parada Cardiorrespiratória.

33. Sobre a Reanimação Cardiopulmonar em pediatria, assinale a alternativa **correta**:

- a) A dose de adrenalina utilizada em pediatria é a mesma utilizada em adultos.
- b) Amiodarona não deve ser utilizada na Parada cardiorrespiratória de crianças, mesmo em ritmos chocáveis.
- c) Não se deve utilizar desfibrilador em crianças, pelo risco de lesão miocárdica.
- d) Na ausência de via aérea avançada, em crianças, a relação compressão ventilação deve ser de 15 compressões para 02 ventilações.

34. Sobre a Reanimação Cardiopulmonar, analise as alternativas abaixo:

- I. Deve-se evitar ventilação excessiva e minimizar as interrupções nas compressões.
- II. Quando o paciente estiver com via aérea avançada, deve-se aplicar uma ventilação a cada 8 segundos.
- III. Entre as causas reversíveis de Parada Cardiorrespiratória estão Hipovolemia, Hipóxia e Hipotermia.



Estão corretas:

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

35. Sobre a sistematização utilizada para atendimento pré-hospitalar ao paciente traumatizado, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Nas etapas “A” e “E” o enfermeiro deve se atentar para a avaliação pupilar do paciente, a fim de identificar possíveis danos neurológicos.
- b) O mnemônico que padroniza o atendimento inicial ao paciente politraumatizado é o XABCDE.
- c) O “X” se refere ao controle da Hemorragia exsanguinante (controle do sangramento externo grave).
- d) O “B” se refere à respiração e o “C” à circulação.

36. Durante um plantão no serviço de urgência pré-hospitalar, você foi acionado para atendimento a um paciente em comportamento suicida. Sobre sua atuação neste atendimento, analise as afirmativas abaixo:

- I. Você não deve falar com o paciente sobre a tentativa de suicídio, pois isso pode aumentar o risco da pessoa suicidar-se.
- II. Você deve investigar sobre os fatores de proteção durante sua avaliação, a exemplo do apoio familiar.
- III. A equipe deve ter em mente que, quando há mais de duas tentativas de suicídio, o paciente está querendo “chamar a atenção”.

Estão corretas:

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Todas estão corretas.

37. Sobre o atendimento a um paciente em crise de saúde mental, apresentando agitação psicomotora, analise as afirmativas abaixo:

- I. O profissional deve utilizar um tom de voz baixo, trazendo tranquilidade, pois isso pode provocar uma reação semelhante no indivíduo agitado. Deve aproveitar o momento da abordagem para fazer anotações e registros sobre o quadro do paciente.
- II. O profissional não deve debater, ou julgar, ou dizer que a pessoa está errada.



III. A contenção física é o emprego de meios físicos externos que interferem na liberdade de movimentos corporais do paciente, com a finalidade de impedir hetero ou autoagressão. É sempre o primeiro recurso a ser utilizado em casos de agitação psicomotora.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Todas estão corretas.

38. Sobre o Tamponamento Cardíaco, analise as afirmativas abaixo:

- I. O tamponamento cardíaco ocorre quando há acúmulo de líquido dentro do saco pericárdico.
- II. Embora se pense no tamponamento cardíaco causado por motivo traumático, existem muitas causas clínicas para esta condição, a exemplo de causas infecciosas, inflamatórias e autoimunes.
- III. Em casos de tamponamento cardíaco, é importante que o enfermeiro se atente para a administração de oxigênio, acesso vascular, monitorização e realização de Eletrocardiograma de 12 derivações.

Estão corretas:

- a) Apenas I.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e III.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

39. Sobre as varizes esofágicas, analise as afirmativas abaixo:

- I. As varizes esofágicas são veias que se tornaram dilatadas em consequência de pressão crescente que provoca dano às veias e enfraquece suas estruturas.
- II. Estas varizes surgem quando o fluxo sanguíneo pelo fígado encontra resistência (hipertensão portal).
- III. No atendimento pré-hospitalar é importante que o enfermeiro avalie a perda de sangue e se atente para instabilidade hemodinâmica.

Estão corretas:

- a) Apenas I
- b) Apenas II
- c) Apenas II e III
- d) Todas estão corretas.



40. Sobre os distúrbios eletrolíticos, analise as afirmativas abaixo:

- I. A hiperpotassemia se refere a um aumento do nível de Potássio, podendo ser causada pela ingestão de suplementos de Potássio, insuficiência renal e doença de Addison.
- II. A Hiponatremia é definida como a concentração sérica de Sódio inferior a 135 mEq/L.
- III. A Hipocalcemia é decorrente da lesão do tecido muscular, levando a liberação de mioglobina na corrente sanguínea.

Estão corretas:

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e II.





GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE DOCUMENTO,
SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	