

## PROCESSO SELETIVO 2023

Ano Letivo de 2024

### PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

### INSTRUÇÕES

- 01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos.
- 02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha.
- 03) A duração da prova **com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas**, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta.
- 04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos Fiscais.
- 05) A prova é **INDIVIDUAL**, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 07) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 08) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas.
- 09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-Resposta.
- 10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma:
  - a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
  - b) Assine no local indicado;
  - c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão;
  - d) Não o amasse, nem dobre.

## PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

### QUESTÕES GERAIS

1. O Ministério da Saúde define Segurança do Paciente “reduzir a um mínimo aceitável, o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde”. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Aliança Global para a Segurança do Paciente, estima-se que cerca de 1 a cada 10 usuários do sistema de saúde poderá ser vítima de erros e incidentes evitáveis. De acordo com a OMS (2009), há uma classificação para os erros e incidentes que acontecem nos serviços de saúde descritos pela “Classificação Internacional de Segurança do Paciente”.

Para responder essa questão, leia o caso a seguir:

*“M.C.S., 5 anos, sexo feminino, acompanhada pela mãe, internou no Hospital Barreirinha e mãe relata que criança está há 4 dias apresentando tosse com secreção, febre de 40°C, calafrios e falta de ar. Realizado exames de imagem e laboratoriais, aguardando resultados. A equipe de enfermagem orientou a mãe sobre a importância de manter as grades do leito elevadas, evitando a queda da criança. A mãe se ausentou do quarto por alguns minutos e esqueceu de levantar as grades do leito, ocasionando a queda da criança do leito e fratura do braço E”.*

Com relação a classificação dos incidentes, de acordo com a OMS, assinale a alternativa **correta** que corresponde a classificação do incidente deste caso:

- a) risco notificável.
- b) incidente sem dano.
- c) evento adverso.
- d) *near miss*.

2. Teixeira (1996) define o conceito de Biossegurança:

*“biossegurança pode ser entendida como uma série de ações, procedimentos, técnicas, metodologias e dispositivos com o objetivo de prevenir, minimizar ou eliminar riscos envolvidos na pesquisa, na produção, no ensino, no desenvolvimento tecnológico e na prestação de serviços, os quais podem comprometer a saúde do ser humano, dos animais e do meio ambiente, bem como a qualidade dos trabalhos desenvolvidos” (Teixeira, 1996 apud Stapenhorst et al., 2018, p.18).*

A Biossegurança possui um papel fundamental na promoção da saúde, controle de infecções para proteção dos trabalhadores aos riscos de saúde que podem estar expostos em sua prática profissional. Relacione a primeira coluna com a segunda coluna de acordo com os tipos de riscos em Biossegurança e após assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

1. Risco Biológico ( ) máquinas e equipamentos sem proteção, probabilidade de incêndio e explosão, arranjo físico inadequado, armazenamento inadequado.
2. Risco Químico ( ) levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada de trabalho, etc.
3. Risco Físico ( ) poeiras, fumos gases, neblinas, névoas ou vapores.
4. Risco Ergonômico ( ) bactérias, vírus, fungos, parasitos, entre outros.
5. Risco de Acidentes ( ) ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não-ionizantes, vibração.

Assinale a alternativa que corresponde com a sequência **correta de cima para baixo**:

- a) 5; 4; 2; 1; 3.  
b) 3; 2; 1; 4; 5.  
c) 5; 4; 2; 3; 1.  
d) 3; 2; 1; 5; 4.

3. A Norma Regulamentadora (NR32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade.

Analise as sentenças a seguir:

- I. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas não necessitam conter lavatório em seu interior.
- II. É permitida a guarda e o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, desde que se pratique todas as medidas necessárias para evitar transmissão de infecções.
- III. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. Sendo vetada o uso de calçados abertos.
- IV. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I, II e III estão corretas.  
b) I e III estão corretas.  
c) I, II, III e IV estão corretas.  
d) III e IV estão corretas.

4. A Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012 pelo Conselho Nacional de Saúde, considera o respeito pela dignidade humana e pela especial proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos, para isso, aprova diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisas que envolvem seres humanos. A resolução descreve as responsabilidades **Do Pesquisador Responsável** pela pesquisa, assinale a alternativa **correta** no que **cabe ao pesquisador**:

- a) Apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento, não sendo necessário o envio de relatórios parciais e final.
- b) Manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa.
- c) Quando uma pesquisa está em andamento e há a interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados, não há necessidade de justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP a decisão do pesquisador.
- d) Pesquisas retrospectivas, análise de prontuários, o pesquisador já pode iniciar a pesquisa, antes mesmo de passar pela aprovação ética do CEP ou CONEP.

5. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), elabora o Ofício Circular nº 2/2021/CONEP/SECNS/MS - Assunto: Orientações para procedimentos em pesquisas com qualquer etapa em ambiente virtual, que orienta pesquisadores e Comitês de Ética em Pesquisa em relação a procedimentos que envolvam o contato com participantes e/ou coleta de dados em qualquer etapa da pesquisa, em ambiente virtual. Tais medidas visam preservar a proteção, segurança e os direitos dos participantes de pesquisa. Analise as sentenças a seguir sobre o Ofício Circular:

- I. Caso a pesquisa envolva formulários online, deve-se garantir ao participante de pesquisa o direito de não responder qualquer questão, sem necessidade de explicação ou justificativa para tal, podendo também se retirar da pesquisa a qualquer momento.
- II. Caso a pesquisa envolva formulários online, o pesquisador poderá elaborar perguntas que sejam de resposta obrigatória do participante, pois, o mesmo já assinou o consentimento em participar da pesquisa, sendo obrigatório sua resposta em todo o formulário de pesquisa, não prejudicando o andamento da pesquisa, por ausência de resposta.
- III. Deve-se garantir ao participante de pesquisa o direito de acesso ao teor do conteúdo do instrumento (tópicos que serão abordados) antes de responder as perguntas, para uma tomada de decisão informada e terá acesso às perguntas somente depois que tenha dado o seu consentimento.
- IV. Uma vez concluída a coleta de dados, é recomendado ao pesquisador responsável fazer o download dos dados coletados para um dispositivo eletrônico local, apagando todo e qualquer registro de qualquer plataforma virtual, ambiente compartilhado ou "nuvem".

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I e III estão corretas.
- b) I, III e IV estão corretas.
- c) II e III estão corretas.
- d) II, III e IV estão corretas.

6. A biotecnologia é a base para as pesquisas com transgênicos e contribui para o desenvolvimento de novos produtos como medicamentos, alimentos, produtos médicos, agricultura, assim como em vários outros setores. Analise as afirmativas abaixo acerca dos Organismos Geneticamente Modificados (OGM) e assinale a alternativa **correta**:

- a) São considerados OGMs os organismos obtidos por técnicas de fusão celular, mutantes naturais, por metagênese e por clonagem.
- b) Os OGMs são classificados de acordo com os benefícios que oferecem à saúde humana e ao meio ambiente.
- c) OGM é todo organismo (microrganismo, animal ou vegetal) cujo genoma foi modificado por qualquer técnica de engenharia genética.
- d) Cabe à CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) indicar para cada projeto específico um pesquisador principal responsável pela pesquisa.

7. A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do SUS, para o desenvolvimento da vigilância em saúde, visando a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de doenças e agravos (BRASIL, 2018).

Neste contexto, entende-se por ..... o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-transmissíveis, e agravos à saúde.

Considerando o texto acima, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

- a) vigilância em saúde ambiental.
- b) vigilância em saúde do trabalhador.
- c) vigilância epidemiológica.
- d) vigilância sanitária.

8. A Notificação Compulsória realizada em até 24 horas da observação da doença ou de caso suspeito é denominada:

- a) Diária
- b) Imediata
- c) Sazonal
- d) Semanal

9. Indicadores de saúde são valores quantitativos usados para medir o estado ou nível de saúde de uma população, em determinado momento ou espaço de tempo, ou ainda, em determinado local. Em relação aos indicadores é **correto** afirmar:

- a) A prevalência expressa o número de novos casos de uma determinada doença durante um período de tempo específico e indica o risco de população/indivíduo tornar-se doente.
- b) A integridade ou completude de um indicador é a capacidade de reproduzir os mesmos resultados quando aplicado em condições semelhantes.
- c) A incidência expressa o número de casos existentes (novos e antigos) de uma doença em um ponto do tempo e estima a probabilidade de uma população estar doente num determinado período específico.
- d) A morbidade é um termo utilizado para designar o conjunto de casos de uma determinada afecção ou agravos à saúde, que atingem um grupo de pessoas e são capazes de produzir uma doença.

10. O Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado por meio de recursos federais, estaduais e municipais, além de contribuições sociais e impostos. A União deverá investir no SUS o mesmo valor disponibilizado no ano anterior, acrescido da variação nominal do Produto Interno Bruto - PIB (BRASIL, 2012). Qual das alternativas abaixo apresenta os percentuais que deverão ser aplicados no SUS pelos municípios e estados, respectivamente:

- a) 15% e 15%.
- b) 12% e 15%.
- c) 12% e 20%.
- d) 15% e 12%.

11. A Lei nº 8142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. Segundo a referida legislação, o SUS contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) Conselhos de Saúde e Fundos de Saúde.
- b) Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde.
- c) Fundos de Saúde e Planos de Saúde.
- d) Conferências de Saúde e Fundos de Saúde.

12. Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde e ao processo saúde-doença, é **correto** afirmar:

- a) A equidade, como direito fundamental previsto na Constituição de 1988, é a garantia de saúde a todo e qualquer cidadão, de forma indistinta.
- b) A descentralização consiste na transferência de responsabilidade de gestão e do financiamento total do SUS para os municípios.
- c) A universalidade entende o usuário inserido em seu contexto social e, a partir daí, atende as demandas e necessidades desta pessoa.
- d) O processo saúde-doença da população sofre influência de determinantes sociais, dos tempos, lugares e das culturas.

13. Em 2003 foi instituída a Política Nacional de Humanização (PNH), que veio para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários (BRASIL, 2013). Vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, a PNH tem princípios e diretrizes. Acerca das diretrizes dessa política, assinale a alternativa **correta**:

- a) A gestão participativa é uma ferramenta com a finalidade de contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, levando em conta a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença.
- b) A ambiência representa a criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- c) Uma das diretrizes da PNH é o acolhimento, que necessita de horário determinado previamente e de profissionais específicos para que essa ação seja feita com qualidade.
- d) A transversalidade é o compartilhamento da gestão com os usuários e com a comunidade, diante do processo de cuidado em saúde, desde o atendimento básico até a seleção dos trabalhadores servidores públicos.

14. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultante da atuação de muitos agentes com protagonismo histórico na saúde pública e na consolidação do Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2012). De acordo com a PNAB, assinale a alternativa correta que apresenta princípios e/ou diretrizes orientadores das ações da atenção básica:

- a) Hierarquização dos serviços, centralização do poder de decisão e gestão, participação da comunidade.
- b) Continuidade do cuidado, territorialização, resolutividade.
- c) Integralidade, cuidado centrado na doença, ordenação da rede de serviços.
- d) Família como cenário do cuidado, centralização do poder de decisão e gestão, hierarquização dos serviços.

15. O Pacto pela Saúde é o acordo firmado entre os gestores do SUS que visa consolidar os princípios do SUS nas três esferas de governo. Esse acordo trouxe mudanças significativas para a gestão e possui três componentes (BRASIL, 2006). Analise a definição abaixo e responda a que se refere:

“É o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira”.

- a) Pacto em defesa do SUS.
- b) Pacto pela vida.
- c) Pacto de gestão.
- d) Pacto pela democracia na saúde.



16. A Estratégia Saúde da Família (ESF) reorientou o processo de trabalho da Atenção Básica, com foco na abordagem familiar, ampliando a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas. Para que essa abordagem seja efetiva, é necessário um diagnóstico comunitário que realmente expresse as condições de saúde no contexto familiar, havendo vários instrumentos para isso. O instrumento de abordagem familiar que consiste na representação gráfica do sistema familiar, preferencialmente em três gerações (no mínimo), que se utiliza de símbolos previamente padronizados e identificam os componentes da família, suas relações, histórico de doenças e vulnerabilidades (SCHLITHLER *et al.*, 2013) é denominado:

- a) ECOMAPA.
- b) CICLO DE VIDA.
- c) GENOGRAMA.
- d) PRACTICE.

17. Em relação à Atenção Básica, preencha os espaços das afirmações abaixo:  
\_\_\_\_\_ é formado(a) por equipes multiprofissionais que atuam em apoio a \_\_\_\_\_ e também \_\_\_\_\_. O(A) \_\_\_\_\_ oferece apoio especializado na Atenção Básica, próximo da população e com base na \_\_\_\_\_. Recebe a demanda por negociação e discussão compartilhada com as equipes que apoia, e \_\_\_\_ por meio de encaminhamentos impessoais.

**Assinale a alternativa que contém as palavras na sequência correta do preenchimento:**

- a) NASF, equipes de saúde da família, equipes de atenção básica, NASF, integralidade, não.
- b) ESF, NASF, equipes de atenção básica, ESF, universalidade, também.
- c) ESF, NASF, equipes ribeirinhas, NASF, equidade, não.
- d) NASF, equipes de atenção básica, equipes de atenção especializada, ESF, universalidade, também.

18. A gestão de serviços de saúde é um conjunto de práticas que têm como objetivo o planejamento, organização e administração de todas as atividades de uma instituição que oferece assistência à saúde, seja de natureza pública ou privada (RABELLO, 2022). Acerca da gestão e planejamento em serviços de saúde é correto afirmar:

- a) Ocorre o controle e gerenciamento de todos os recursos necessários para viabilizar a administração de uma instituição de saúde, considerando que os recursos são limitados aos financeiros e humanos.
- b) A gestão de serviços de saúde compreende processos como planejamento estratégico, coordenação e controle, ficando o acompanhamento dos indicadores restrito às auditorias externas, contratadas para este fim.
- c) A gestão de saúde deverá ser exercida, necessariamente, por um profissional de saúde, responsável por lidar com todos os aspectos administrativos da instituição.



- d) O êxito no alcance dos objetivos propostos na gestão, está diretamente relacionado à qualidade e clareza da comunicação interna desenvolvida na instituição, onde todos precisam estar munidos das mesmas informações.

19. Os modelos de atenção à saúde são combinações tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento das necessidades de saúde da população, tanto individuais quanto coletivas, possuem características diferenciadas e estão relacionadas diretamente às políticas públicas de saúde. Um dos modelos instituídos no Brasil, no início do século XX (até 1929) foi o modelo sanitarista campanhista, caracterizado por:

- a) Modelo centrado nas ações médico-curativas, excessivamente especializado, de alto custo e baixa resolutividade.
- b) Centrado nas práticas curativas altamente especializadas e fragmentadas e na organização voltada ao complexo médico hospitalar.
- c) Voltado essencialmente ao controle das endemias e a assistência à saúde individual era prestada, na grande maioria, pelos serviços privados.
- d) Preconiza a integralidade do cuidado, a garantia do acesso, a regionalização e descentralização dos serviços, as ações humanizadas e resolutivas de saúde.

20. A comunicação é uma ferramenta essencial para a educação em saúde, humanização dos serviços e promoção de estratégias em benefício do bem estar da população. Quanto à educação e comunicação na área da saúde, é **correto** afirmar:

- a) O processo de comunicação que ocorre entre o profissional de saúde e o paciente, deve ser claro, impessoal e estar limitado às questões relativas à patologia, tratamentos ou procedimentos a serem realizados.
- b) Ações de educação em saúde devem levar em consideração os condicionantes e determinantes sociais da saúde com intuito de contribuir para melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, dos grupos e da sociedade.
- c) A comunicação e a educação em saúde são relativas aos gestores e aos trabalhadores da saúde, valorizando o conhecimento científico em detrimento do conhecimento prévio da população, que muitas vezes é baseada em mitos e superstições.
- d) A educação permanente é considerada um dos principais dispositivos da política de educação na saúde, considera a constante qualificação do indivíduo e não está necessariamente relacionada a questões específicas do trabalho.

## PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

### QUESTÕES ESPECÍFICAS

21. John (5 anos), está internado em um Hospital Infantil acompanhado pela sua mãe Judith. Está em pós-operatório imediato de amigdalectomia. Em sua visita rotineira, a enfermeira Janice realiza o exame físico completo da criança. No que diz respeito à propedêutica do exame físico de John, analise as assertivas a seguir:

I – A sequência cefalopodal deve ser respeitada, pois iniciar o exame por cabeça e pescoço permitirá que John apresente comportamento de prontidão mais rapidamente.

II - Ao realizar a ausculta cardíaca, considerar os quatro focos de ausculta: mitral, tricúspide, aórtico e pulmonar.

III - Para o exame pulmonar, as técnicas propedêuticas utilizadas são inspeção e ausculta; percussão e palpação não são realizadas no exame pulmonar pediátrico.

IV – Verificar os sinais vitais de John e aplicar escala de dor específica para sua faixa etária.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) III e IV.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) I e II.

22. Merinalva, vai à Unidade de Saúde para receber a vacina contra a febre amarela. Ela amamenta exclusivamente Maxmedalarrara de 4 meses de idade e não sabe como proceder. Assinale a alternativa que contempla a orientação quanto à amamentação do lactente nesta situação:

a) Merinalva não será vacinada contra a febre amarela, pois esta vacina é contraindicada para lactantes independente da idade do lactente e área de residência, portanto a amamentação deve ser mantida.

b) Merinalva será vacinada contra a febre amarela caso ela esteja em área de circulação do vírus, e a amamentação deve ser mantida.

c) Merinalva será vacinada contra a febre amarela, independente da idade do lactente e área de residência e a amamentação deve ser interrompida.

d) Merinalva será vacinada contra a febre amarela caso ela esteja em área de circulação do vírus, e a amamentação deve ser interrompida por 10 dias.

23. A síndrome nefrótica é um estado clínico que inclui proteinúria maciça, hipoalbuminemia, hiperlipidemia e edema (HOCKENBERRY; WILSON, 2014). Analise as assertivas a seguir, no que diz respeito a esta patologia:

I - Os sintomas da síndrome nefrótica incluem: apatia, diarreia, hipertermia, dispneia, derrame pleural, alterações cutâneas, edema palpebral, anasarca, dor abdominal, entre outros.

II - Com a detecção precoce e a implementação da terapia para erradicar a proteinúria, não é necessária a utilização de diurético para controle do edema.

III - A oferta de dieta hipossódica depende do resultado do balanço hídrico e da intensidade do edema do paciente.

IV - Considerando o edema periorbital, um dos cuidados de enfermagem à criança é limpar as pálpebras edemaciadas com solução salina morna.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I e IV.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) II e III.

24. Penélope (5 meses), chegou ao pronto socorro devido a quadro de bronquiolite. Analise as assertivas a seguir quanto aos cuidados com esta criança:

I. Manter acesso venoso permeável.

II. Promover a hidratação venosa.

III. Evitar nebulização com broncodilatadores devido à piora do quadro respiratório.

IV. Ofertar oxigenioterapia se criança apresentar cianose e tiragem intercostal

Assinale a alternativa correta:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I e IV.

25. Henrique (10 anos) tem hidrocefalia e sua Derivação Ventrículo-Peritoneal (DVP) está obstruída. Internou para troca do dispositivo, mas uma complicação resultou na instalação de uma Derivação Ventricular Externa (DVE). Quanto aos cuidados com a DVE, assinale a alternativa **correta**:

a) Manter o paciente com a cabeceira em 90° em relação à altura da bolsa coletora.

b) Anotar débito de DVE a cada turno, atentando para o volume de líquido drenado e a sua coloração.

c) Trocar curativo diariamente utilizando técnica limpa com clorexidina alcoólica ao redor da inserção do cateter.

d) Anotar débito de DVE, atentando para o volume de líquido drenado e a sua coloração, esvaziando a bolsa coletora a cada turno.

26. Huberlina comparece hoje à UBS para vacinação de seu filho Hordilei, de 42 dias de vida, nascido de parto normal no domicílio. Não realizou nenhuma dose de vacina até o momento. Assinale a alternativa com a conduta **correta** neste caso.

- a) Devem ser administradas as vacinas contra Hepatite B e BCG.
- b) Deve ser administrada apenas Hepatite B, pois não se deve aplicar a BCG simultaneamente.
- c) Nenhuma das vacinas deve ser administrada pois há necessidade de intervalo de 30 dias para aplicação das vacinas de 2 meses, que não podem ser atrasadas.
- d) Deve ser administrada apenas BCG, pois com essa idade não se realiza mais esta dose da vacina contra hepatite B.

Com base no caso descrito, responda às questões 27 e 28.

Igor, 3 anos de idade, 03º dia de internação na pediatria por fratura em MSD, acompanhado pela mãe lone, que se encontra angustiada e preocupada por não compreender o que está acontecendo, além de relatar que não sabe como fazer para continuar acompanhando pois deixou o outro filho, de 2 anos, com sua mãe. Igor apresenta-se agitado, irritado e choroso, especialmente durante os cuidados da equipe de enfermagem devido a dor em MSD.

27. Considerando a condição de Igor, assinale o Diagnóstico de Enfermagem mais adequado para esta situação:

- a) Engajamento diminuído em atividades de recreação relacionado a dispneia e uso de oxigenoterapia evidenciado por relato da mãe e da equipe de enfermagem.
- b) Estilo de vida sedentário relacionado a fratura em MSD e dor aguda evidenciado pela irritabilidade, agitação e auto relato da criança.
- c) Engajamento diminuído em atividades de recreação relacionado a fratura em MSD e dor aguda evidenciado por irritabilidade, agitação e auto relato.
- d) Estilo de vida sedentário relacionado a fratura em MSD, dispneia, dor aguda evidenciado pela inatividade física e auto relato.

28. Considerando o estado de lone, assinale o Diagnóstico de Enfermagem mais adequado para esta situação:

- a) Planejamento de atividade ineficaz relacionado a internação do filho mais velho evidenciado por auto relato e comportamento de preocupação e angústia.
- b) Conflito no papel de mãe relacionado a angústia e preocupação por não conseguir compreender a evolução clínica apresentada evidenciado pela internação do filho e condição clínica.
- c) Planejamento de atividade ineficaz relacionado a angústia e falta de apoio familiar evidenciado por afastamento do filho mais novo e agressividade.
- d) Conflito no papel de mãe relacionado ao afastamento do filho mais novo e dificuldade financeira evidenciado pela internação do filho e condição clínica.

29. Deobaldo (sexo masculino) e Deolene (sexo feminino) são gêmeos. Eles têm 10 anos e são trazidos pelos pais para a vacinação de rotina. Quais vacinas eles receberão?

- a) Deobaldo e Deolene serão vacinados contra HPV e Meningo C.
- b) Deobaldo e Deolene serão vacinados contra HPV e Meningo ACWY.

- c) Deolene será vacinada hoje, com a vacina contra HPV.
- d) Deobaldo e Deolene serão vacinados contra HPV.

30. O levantamento das medidas antropométricas configura uma parte essencial da avaliação do crescimento infantil, exigindo do(a) enfermeiro(a) raciocínio clínico. Com relação a medição do comprimento em menores de 2 anos, assinale a alternativa **correta**.

- a) Posicionar a criança em decúbito dorsal, colocando a fita métrica lateralmente ao seu corpo, mantendo a cabeça ereta, ombros e nádegas em contato com a fita, segurando os joelhos em posição estendida, fletindo os pés para frente.
- b) Acomodar a criança em superfície plana, no centro do antropômetro, segurando a cabeça no Plano de Frankfurt, ombros, nádegas e calcanhares em contato com a superfície de apoio, mantendo os joelhos estendidos, com sola dos pés em ângulo reto.
- c) Acomodar a criança no colo da mãe, posicionando o antropômetro, segurando a cabeça da criança na posição ereta, com ombros, nádegas e calcanhares em contato com o antropômetro, mantendo os joelhos estendidos, e sola dos pés em ângulo reto.
- d) Posicionar a criança em superfície plana, colocando a fita métrica lateralmente ao seu corpo, segurando a cabeça no Plano de Frankfurt, ombros e nádegas em contato com a fita, segurando os joelhos em posição estendida, fletindo os pés para frente.

31. As medidas antropométricas fazem parte da avaliação do crescimento infantil, que devem ser realizadas de forma cuidadosa, seguindo parâmetros pré-estabelecidos e cientificamente comprovados. Desta forma, analise as assertivas a seguir.

- I. A avaliação do incremento do peso em lactentes, em especial nos primeiros meses de vida, configura-se relevante na avaliação nutricional, para estabelecer condutas de alimentação.
- II. Na faixa etária de 12 a 36 meses a medição da estatura deve ser com a criança deitada, utilizando régua antropométrica, com a criança despida e descalça, e com a cabeça livre de adereços.
- III. Na medição do Perímetro Cefálico tem-se de forma indireta, a avaliação do crescimento cerebral nos primeiros 18 meses de vida, devendo mostrar aceleração por volta dos 12 meses de vida.
- IV. A medição da circunferência abdominal utiliza o ponto médio entre a última costela fixa e a crista ilíaca superior, aproximadamente dois dedos acima da cicatriz umbilical.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) III e IV.
- d) II e III.

Com base no caso clínico a seguir, responda às questões de números 32, 33 e 34.

Auriana, criança de 18 meses, 2ºPO de cirurgia oncológica de ressecção de tumor de SNC, está acompanhada de sua mãe. Auriana apresenta PICC, acesso venoso periférico em MSE

salinizado, além de uso de fralda. Foi submetida a sessões de quimioterapia anteriores ao procedimento cirúrgico para redução da massa tumoral. Devido a sua condição clínica, apresenta dificuldade na deglutição, na mobilidade de MMSS e MMII, no controle de esfíncteres e paralisia homolateral à esquerda, permanecendo restrita ao leito maior parte do tempo, revezando com o colo da mãe. Segundo a mãe, Auriana tem apresentado dor constante desde a cirurgia.

32. Assinale a alternativa que melhor retrata os fatores de suscetibilidade ao desenvolvimento de lesão de pele pela criança.

- a) uso de corticoide, déficit nutricional, imunossupressão, faixa etária.
- b) higiene precária, integridade da pele descontinuada, leucopenia, cateter venoso periférico.
- c) faixa etária, uso de medicação antineoplásica, uso de albumina, déficit nutricional.
- d) uso de fralda, restrição no leito, déficit na mobilidade de MMSS e MMII, paralisia homolateral.

33. A partir de seu julgamento clínico e considerando a condição de Auriana, assinale o Diagnóstico de Enfermagem mais adequado para esta situação.

- a) Risco de síndrome do desuso relacionado a quadro algico e lesão cerebral, paralisia homolateral e restrição no leito.
- b) Constipação funcional crônica relacionada à restrição no leito e lesão cerebral caracterizada por quadro algico, uso de fralda e dificuldade na deglutição.
- c) Risco de síndrome do desuso relacionado a restrição no leito e disfunção de esfíncteres caracterizado por uso de PICC, uso de fralda e déficit na mobilidade de MMSS.
- d) Constipação funcional crônica relacionada à dificuldade de deglutição e paralisia homolateral à esquerda caracterizada por uso de fralda, quadro algico e uso de PICC.

34. As infecções associadas aos cuidados de saúde são eventos adversos potencialmente graves para o paciente crítico pediátrico, sendo que o crescente avanço das tecnologias utilizadas nos serviços de saúde acarreta mudanças nos cuidados prestados aos pacientes e, logo, nos fatores de risco para tal condição clínica. A respeito das ações preventivas de infecções, analise as afirmativas a seguir:

- I. As infecções relacionadas à assistência à saúde são de difícil prevenção no ambiente de terapia intensiva, tendo em vista a complexidade do cuidado ao paciente crítico, a multiplicidade de procedimentos realizados e a necessidade de implementação de medidas complexas de prevenção.
- II. As principais infecções relacionadas à assistência em terapia intensiva são a pneumonia associada à ventilação (PAV), a infecção primária de corrente sanguínea, a infecção de sítio cirúrgico e a infecção urinária associada ao uso de sonda vesical de demora.
- III. As ações de prevenção de infecções relacionadas à assistência são medidas simples de serem implementadas, uma vez que perfazem estratégias como a educação permanente em saúde e ações como higienização das mãos, cuidados relacionados a práticas assépticas e vigilância constante.

IV. Apesar da grande incidência em UTI este tipo de infecção não tem grande impacto na morbimortalidade do paciente pediátrico crítico, tendo em vista a multiplicidade de estratégias terapêuticas para manejo de tais infecções e o avanço tecnológico em saúde.

Assinale a alternativa **correta**:

- a) I e III.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) II e IV.

35. A inserção de sonda nasogástrica e nasoenteral pode ser considerada o meio mais fisiológico para permitir a nutrição enteral em pacientes que não podem receber alimentação oral. Porém, esses dispositivos podem causar complicações para o paciente devido ao material de que são fabricados e ao acesso nasal (MOTA et al., 2021, p. 18). Considerando as possíveis complicações deste procedimento, assinale a alternativa **correta**.

- a) a obstrução da sonda está relacionada à formação de bezoar, que são conglomerados digestivos que se acumulam na sonda, e devem ser retirados com aspiração gástrica a cada 2 horas.
- b) a prevenção de obstrução da sonda requer a interrupção da dieta enteral antes da administração de medicamentos e lavagem da sonda entre as administrações.
- c) a conduta indicada para o evento adverso aspiração pulmonar é retirar a sonda imediatamente, mantendo paciente em decúbito lateral esquerdo e comunicar o médico responsável.
- d) a lesão por pressão nasal é evitável por meio da movimentação da sonda a cada 6 horas. A sonda é um agente externo; portanto, seu longo tempo de permanência, sem movimentação, pode causar lesões e desconforto.

36. Partindo do princípio do cuidado centrado na família, o enfermeiro planeja os seus cuidados em redor de toda a família, incentivando a participação dos pais nos cuidados durante a hospitalização. As intervenções de apoio à adaptação têm impacto na diminuição da ansiedade e stress das crianças e dos pais, visto aumentarem a capacidade destes para participarem no cuidado, para receberem informação, capacitando-os para a participação na tomada de decisão partilhada (BARROS et al., 2021, p. 566). Sobre este contexto, leia atentamente as afirmativas a seguir:

- I. Aumentar as formas de comunicação com a criança é importante. A utilização de jogos, brincadeiras, leitura e demonstração e explicação de procedimentos, são exemplos disto.
- II. A manutenção de uma rotina para a criança é uma estratégia relevante, contudo tendo em vista as peculiaridades do contexto de Unidade de Terapia Intensiva isto se torna inviável.
- III. Técnicas de relaxamento, distração, humor, brinquedo terapêutico, arteterapia, musicoterapia, terapia com animais e grupos terapêuticos são estratégias de adaptação que podem ser utilizadas.
- IV. Estratégias promotoras de esperança são importantes para o enfrentamento de adversidades e para minimizar o medo e o impacto negativo das



experiências de doença e hospitalização.

V. A promoção de liberdade de movimento perfaz uma ação de extrema relevância, e pode ser aplicada sem restrições e em qualquer ambiente hospitalar.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) I, II e V.
- b) II, IV e V.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e V.

37. RN de Márcia Freitas é transferido do Alojamento Conjunto à UTI Neonatal por icterícia neonatal. Seu nome é Luan e está com 5 dias de vida. Ao ser admitido, a enfermeira Raissa procede ao exame físico, e no que diz respeito ao exame de cabeça, refere em sua evolução além de escleras ictéricas; “fontanelas dentro do esperado para a idade”, isso quer dizer que:

- a) Fontanelas bregmática e lambdóide abauladas e suturas pérvias.
- b) Fontanelas bregmática e lambdóide normotensas e suturas pérvias.
- c) Fontanela bregmática fechada e lambdóide normotensa e suturas pérvias.
- d) Fontanela lambdóide fechada e suturas pérvias.

38. Segundo o Ministério da Saúde, a meningite é um processo inflamatório das meninges que pode ser causado por diversos agentes infecciosos. As meningites bacterianas e virais são as mais importantes do ponto de vista clínico e de saúde pública, devido sua magnitude e capacidade de surtos e, no caso da meningite bacteriana, a gravidade. Desta forma, analise as assertivas abaixo.

- I. Na meningite bacteriana a transmissão pode ocorrer de diversas maneiras, como por exemplo vias respiratórias, gotículas, contato próximo e fecal-oral.
- II. Na meningite viral a sintomatologia se caracteriza por febre, cefaleia, êmese, inapetência, rigidez no pescoço, sonolência, letargia, fotofobia.
- III. Na meningite viral os agentes infecciosos podem ser Adenovírus, Coxsackie vírus, *Haemophilus influenzae* e Epstein-Barr.
- IV. Ao contrário da meningite viral, a meningite bacteriana demanda a hospitalização do paciente para uso de antibióticos e monitoração deste.

Assinale a alternativa com as assertivas **corretas**:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) III e IV.
- d) II e IV.

39. Felício, tem 6 anos e precisará da confecção de uma colostomia temporária. Os pais muito envolvidos, mostram-se preocupados em como a criança irá reagir com o uso do dispositivo. Edulina é a enfermeira da oncologia pediátrica que faz o acompanhamento de Felício desde o diagnóstico clínico. Para auxiliar nesse processo, a enfermeira propõe o uso

do Brinquedo Terapêutico (BT). Assinale a alternativa correta para este contexto.

- a) Edulina deve escolher o BT capacitador de funções fisiológicas, uma vez que Felício necessita ser preparado para a confecção cirúrgica de uma colostomia temporária.
- b) Edulina deve escolher o BT instrucional, pois o objetivo deste é aliviar as tensões e ansiedade da criança para o procedimento cirúrgico e enfrentamento da doença.
- c) Edulina deve utilizar o BT dramático com Felício, pois sua intenção é preparar a criança para o procedimento além de capacitá-lo para o manejo da colostomia.
- d) Edulina deve utilizar o BT capacitador de funções fisiológicas, visto que Felício precisa ser preparado para o enfrentamento de sua condição clínica.

40. Devido ao quadro de choque séptico, Ednésio de 4 anos foi internado em uma UTI pediátrica. Permanece em uso de VM, modo PVC, com FiO<sub>2</sub> em 100% e PEEP 12, mantendo SatO<sub>2</sub> em 90%. CVC em subclávia direita com infusão contínua de drogas vasoativas. Escala de Ramsay 5, pupilas mióticas e puntiformes. Ao observar os parâmetros ventilatórios, quais os cuidados de enfermagem necessários a Ednésio no que diz respeito à aspiração de vias aéreas?

- a) As cavidades oral e nasal do paciente não devem ser aspiradas em hipótese alguma, devido a gravidade do paciente.
- b) A aspiração do tubo orotraqueal deverá ser realizada com sistema aberto e técnica estéril, mesmo que disponível o "trach care", o qual não deve ser considerado.
- c) A aspiração do tubo orotraqueal deverá ser realizada com o dispositivo "trach care", devido a PEEP estar com o valor próximo ao fisiológico e a aspiração em sistema aberto previne a pneumonia associada à ventilação mecânica.
- d) A aspiração do tubo orotraqueal deverá ser realizada com o dispositivo "trach care", devido a PEEP estar com um valor elevado, e isso é uma estratégia protetora.



**GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL)**

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE DOCUMENTO,  
SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	